

BETATUL[®]

Apósito de uso tópico

Apósitos de tul malla hidrófila de 10x10 cm impregnados con un gel de Povidona iodada.

COMPOSICION por apósito:

Povidona iodada, 0,250 g. Excipientes: polietilenglicol 400, 4000, 6000, agua.

ACCION FARMACOLOGICA:

Antiséptico.

INDICACIONES:

Está indicada como antisepsia cutánea en: quemaduras, heridas profundas, tratamiento complementario de úlceras (profundas, por decúbito, varicosas).

POSOLOGIA:

Aplicación diaria o cada 2 días.

MODO DE EMPLEO:

Abrir el sachet y quitar el plástico. Aplicar sobre la herida la compresa impregnada. Recubrir con una gasa o algodón. Sujetar por medio de una venda.

CONTRAINDICACIONES:

No debe ser aplicada a enfermos que presentan intolerancia al yodo.

INCOMPATIBILIDAD y EFECTOS SECUNDARIOS:

No debe utilizarse al mismo tiempo derivados mercuriales. En los raros casos en que se produzca irritación de la piel o alergia, debe suspenderse el tratamiento.

INTOXICACION y SU TRATAMIENTO:

Lavado de la zona lesionada y aplicación de antiinflamatorios, incluyendo los corticoides. En caso de sobredosis o ingestión accidental consultar al Servicio de Información Toxicológica, Teléfono 91 562 04 20.

PRESENTACION y PVP (IVA 4):

Envase con 10 sachets de 1 apósito, 9,99 €

CONDICIONES DE DISPENSACIÓN: Sin receta médica. Especialidad Farmacéutica Publicitaria

Meda Pharma, S.A.U.

Av. Castilla, 2 (Parque Empresarial San Fernando).
28830 San Fernando de Henares (Madrid)