CATRIX®, apósito de colágeno en polvo.

Características

- **Gran capacidad hidrofílica,** cada gramo de polvo puede absorber de 3 a 4 ml de fluido.
- **Reducido tamaño de partícula (35µ).**
- **Material biocompatible.**
- **Fácil aplicación.**
- **Debido a su origen natural el producto se degrada en su totalidad.**
- **Presentación en sobres de 1g estériles.**
- **Un solo uso.**

Descripción
CATRIX es un polvo cicatrizante de colágeno que contiene aproximadamente un 73,5% de proteínas, 18,1% de carbohidratos y 6,4% de otros componentes de cartílago. Las partículas están compuestas pro macromoléculas naturales de colágeno dispuestas en forma de red tridimensional que dejan paso libremente a aquellas moléculas con un peso molecular de hasta 1500..

Modo de acción
CATRIX acelera el proceso biológico de cicatrización pues acelera la formación del tejido de granulación y la epitelización de la lesión. En estudios preclínicos se ha demostrado que su acción cicatrizante es debida, por un lado, a que proporciona soporte estructural al aportar colágeno y aumentar su producción, y por otro, a su efecto sobre fibroblastos y queratinocitos, estimulando su proliferación y su activación, en resumen, acelera el proceso de cicatrización.

Acciones:
- Al aportar colágeno da soporte estructural y favorece la migración celular.
- Atrae fibroblastos y activa macrófagos.
- Estimula la proliferación de fibroblastos (12%) y los queratinocitos (40%).
- Aporta fuerza tensional (hasta un 40 – 50%).
- Posee efecto barrera e impide el crecimiento bacteriano.
- Absorbe el exudado (3 – 4 mL) formando un gel acuoso que genera un clima húmedo que favorece la migración de las nuevas células.

Indicaciones
CATRIX está indicado para el tratamiento de todas aquellas lesiones de la piel que cicatrizan por segunda intención tales como: úlceras por decúbito (estadios I a IV), úlceras de estasis, quemaduras de primer y segundo grado, úlceras diabéticas, úlceras de pies, lesiones con pérdida parcial de sustancia y abrasiones.

Instrucciones de uso
1. Antes de cada aplicación desbridar (p.ej. con colagenasa) y limpiar la lesión de la manera habitual.
2. Aplicar el tratamiento medicamentoso necesario.
3. Aplicar CATRIX esparciéndolo por toda la lesión en una capa fina procurando que se forme una película uniforme sobre la misma y cubrir con un apósito adecuado.
4. En lesiones secas o con poco exudado, CATRIX debe mezclarse con solución salina (4 a 10 mL) antes de su utilización y utilizar un apósito de cura en ambiente húmedo (p. ej. Apósitos hidrocelulares ALLEVYN®).
5. CATRIX debe aplicarse según prescripción facultativa, hasta 1 ó 2 veces al día según el tipo y localización de la lesión y nunca menos de 2 ó 3 veces a la semana.

<u>Instrucciones de uso para lesiones en zonas de difícil acceso</u>
1. Preparar una mezcla de CATRIX con glicerol o con hidrogel, p.ej. INTRASITE® Gel (2 a 5 mL), o con suero salino fisiológico (4 a 10 mL) hasta obtener una consistencia pastosa.
2. Aplicar directamente sobre la lesión de forma que la cubra en su totalidad.

Composición
El producto se presenta en forma de polvo, que contiene:

Proteínas 73,5%
Carbohidratos 16,1%
Otros componentes de cartílago 8,4%

CATRIX®, apósito de colágeno en polvo.

Presentación

Código Producto	Descripción	Unidades / Envase	Envases / Embalaje	Unidad mínima de venta	Código EAN	Código Nacional
5461014	CATRIX sobres de 1 g	14 sobres/caja	20	4 cajas	8428383148186	
5461001	CATRIX sobres de 1 g	3 sobres/caja	40	8 cajas	8428383148155	
5461000SOE*	CATRIX sobres de 1 g	3 sobres/caja	40	1 caja	8470004943511	494351.1

*Reembolsable por la seguridad social

Certificación	Composición	Esterilidad	Conservación	Fabricante
ON nº 0086 **CE nº** 547506 **Clase CE** III, estéril **Smith & Nephew, S.A.U** ISO 9001:2008	LATEX FREE	STERILE R	5 años	Lescarden Inc. 420 Lexington Av. Suite 212 New York 10170. USA EC REP Integral Training SL Balmes 199 08006 Barcelona **Distribuidor** Smith & Nephew, SAU

Leyenda símbolos

LATEX FREE	No contiene látex	STERILE R	Producto esterilizado por irradiación
	Caducidad		No reutilizar
	Temperatura de almacenamiento		No utilizar si el envase está abierto o dañado
	Fabricante	EC REP	Representante autorizado

Curación de Heridas
Smith & Nephew, S.A.U
Fructuós Gelabert, 2-4. 08970. Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel. Atención Cliente: 902 30 31 60 - Fax. Atención cliente: 902 30 31 70
A-28123297
educacionAWM@smith-nephew.com. www.smith-nephew.com